

醫心方卷第十四

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治卒死方第一

治鬼擊病方第三

治魔不寤方第五

治溺死方第七

治中惡方第二

治客忤方第四

治尸厥方第六

治焚燭死方第八



醫心方卷第十四

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治平死方第一

治中惡方第二

治鬼擊病方第三

治客忤方第四

治魔不寤方第五

治尸厥方第六

治溺死方第七

治熱暈死方第八

治凍死方第九

治自經死方第十

治注病方第十一

治諸尸方第十二

治諸瘡方第十三

治鬼瘡方第十四

治溫瘡方第十五

治寒瘡方第十六

治淡實瘡方第十七

治勞瘡方第十八

治嶂瘡方第十九

治間日瘡方第二十

治連年瘡方第二十一

治發作無時瘡方第二十二

傷寒證候方第二十三

傷寒不治候方第二十四

避傷寒方第二十五

治傷寒困篤方第二十六

治傷寒一二日方第二十七

治傷寒三日方第二十八

治傷寒四日方第二十九

治傷寒五日方第二十九

治傷寒六日方第三十

治傷寒七日方第三十一

治傷寒八日九日方第三十二

治傷寒十日以上方第三十二

治傷寒陰毒方第三十三

治傷寒陽毒方第三十六

治傷寒汗出後不除方第三十七

治傷寒鼻衄方第三十八

治傷寒口干方第三十九

治傷寒唾血方第四十

治傷寒吐方第四十一

治傷寒歲方第四十二

治傷寒臨方第四十三

治傷寒下利方第四十四

治傷寒飲食勞復方第四十五

治傷寒洗梳勞復方第四十六



治傷寒陰毒方第卅五

治傷寒汗出後不除方第卅六

治傷寒口干方第卅七

治傷寒吐方第卅八

治傷寒嘔方第卅九

治傷寒飲食勞復方第卅十

治傷寒交接勞復方第卅一

治傷寒後不得眠方第卅二

治傷寒後自痛方第卅三

治傷寒後虛腫方第卅四

治傷寒後下利方第卅五

治傷寒腕豆方第卅六

治傷寒百合病方第卅七

治卒死方第一

治傷寒陽毒方第卅八

治傷寒鼻衄方第卅九

治傷寒唾血方第卅十

治傷寒歲方第卅十一

治傷寒下利方第卅十二

治傷寒洗梳勞復方第卅十三

治傷寒後頭痛方第卅十四

治傷寒後汗出方第卅十五

治傷寒後黃疸方第卅十六

治傷寒手足腫痛欲脫方第卅十七

治傷寒後下部痛方第卅十八

治傷寒後食禁方第卅十九

治傷寒後瘧方第卅十

病源論云卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂素年之衰一也逢月之空二也失時之和三也人有此三虛謂而為賊風所傷使

陰陽偏竭於內陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絕

而死也若府藏氣未竭者良久乃蘇此有魚鱗鬼神

之氣而卒死者皆有須邪退乃治也

葛氏方治卒死或先有痼痛或居常倒仆奄忽而絕

皆是中惡治之方

今二人以氣壅口吹其兩耳極則易人立可以竹筒

吹之並側身遠之莫臨死人上

又方以葱葉刺其耳中口中鼻中血出者莫恠



之氣而卒死者皆有須邪退乃治也

葛氏方治卒死或先有痼痛或居常倒仆奄忽而絕

皆是中惡治之方

今二人以手塞口吹其兩耳極則易人立可以竹筒吹之並側身遠之莫臨死人上

又方以葱葉刺其耳中口中鼻中血出者莫恠

無血難治有血是治候也

又方以綿漬好苦酒中須臾出量死人鼻中干

案令汁入鼻中并持其手足莫令動

又方以人小便灌其面數迴即能語此扁鵲法也

又方末皂莢如大豆吹其兩鼻孔中選則氣通

又方擣女青屑以重一錢上開口內喉中以水苦酒

送之豆治又方灸膺中百壯

又方灸其顙下宛中名秉漿十壯又方灸心下寸

集驗方治卒死方

取牛馬矢汁飲之無新者水和乾者取汁

又方取篋中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四服之

又方梁上塵如大豆糲著竹筒中吹鼻中與俱一

時吹之又方灸面中穴又方取竹筒吹其兩耳不過三

新錄方治卒死方

蕤根鳩取汁服六七合

又方桃白皮切一升水二升煮取八合二服之十服又不老

更服之

僧深方治卒死中惡雷氏千金丸方

大黃五分已豆六十枚桂心二分朴瀝三分干薑二分

凡五物合下篩白蜜合三千午服如大豆二九老小



新錄方治卒死方

蕤根ツイ取汁セリ服六七合

又方桃白皮切一升水二升煮取八合服之十里久不老  
更服之

僧深方治卒死中惡雷氏千金丸方

大黃オホシ五分イ豆六十枚ツイ桂心二分セリ朴ツル三升セリ干薑二分

凡五物治下篩ツイ和白蜜治三千杵セリ服如大豆二九老小以

意量之

枕中方治卒セカ忤惡鬼ツカ魘ツカ死者書額上作鬼字即愈

龍門方療卒死方

取繩圍死者辟ヒキ挽男左女右以繩當大ツカ准ツカ申繩向

下當繩頭灸脊上五十壯又方薑汁ツカ灌鼻

又方以葱黃心刺鼻中入七八寸男左女右立驗ツカ

又方鵠ツカ並汁灌鼻即治又方桂屑著舌下即活

治中惡方第二鬼氣也

病源論云中惡者是入精神衰弱為鬼邪之氣卒中ツカ之也其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死也

廣濟方云卒中惡心腹刺痛ツカ去惡氣方

麝香一分研生犀角二分青木香二分

為散空腹以漿水服方寸匕立愈

范汪方治卒死及心痛腹滿魔忤中惡三物備急丸方

巴豆一分去皮大黃二分去心干薑二分

凡三物異ツカ鵠ツカ巴豆治合丸以蜜九如大豆有急取三九

以水和服之口禁者絞開令藥得入咽中ツカ

又方取坏水以刀三七刺中飲之良

集畧方備急散治卒中惡ツカ腹痛滿欲吐ツカ短氣方



范汪方治卒死及心痛腹滿魔忤中惡三物備急丸方

巴豆一分去皮 大黃二分 干薑二分

凡三物異搗下巴豆治合丸下以蜜丸如大豆有急取三丸

以水和服之口禁者絞開令藥得入咽中

又方取坏水以刀三七刺中飲之良

集畧方備急散治卒中惡痛腹滿欲吐短氣方

大黃二兩金色 桂心八分 巴豆一百枚

凡三物治合下篩取一錢以水七合服之

千金方治卒死中惡方

取牛馬屎汁飲之无新者水和干者亦得

又方葱心黃刺鼻孔中血出愈

又方灸兩脇下 又方灸胃管十五壯

集驗方治中惡方

大豆三七枚以鷄子中黃白酒半升合和頓服之

又方用釜底黑鹽三指撮和水服之腎門六同之

又方以度其兩乳中央屈之後乳頭向後助間灸度

頭隨其社 又方灸胃管五十壯

廣利方療中惡容忤垂死方

麝香錢重研和醋二合服之即差

菲根一把 烏梅十枚 茱萸半升 以勞水一斗

煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮得三升飲之 又方灸足兩母指上中後叢

毛中各十四壯即愈

新錄方治卒中惡方

或一升鹽七合水四升煮取一升二合分再服之



葛氏方古華地治卒中惡短氣死者方

菲根一把 烏梅十枚 茱萸半升 以勞水一斗

煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮得三升飲之 又方灸足兩母指上中後叢

毛中各十四壯即愈

### 新錄方治卒中惡方

或一升塩七合水四升煮取一升二合分再服之

又方桃白皮切一升水二升煮取八合一服之

又方生昌蒲根切三升搗絞取汁服四五合

又方酒服桃人末方寸匕李人末二升

又方伏龍肝末水服二升方寸匕

又方取竹木中惡屎水服方寸匕

又方塩一升水二升煮臨消二服取之

### 治鬼擊病方第三

病源論云鬼擊者諸鬼厲之氣擊著於人也得

之无漸卒著如人以刃旁刺狀胃腸腹內絞急切

痛不可柝按或即吐血或鼻口出血或下血一

名為鬼排言鬼排觸於人也人有氣血虛弱精

魂衰微忽与鬼神遇相觸突致為其所排擊輕者

困而獲免重者多死也

### 葛氏方治鬼擊病方

以淳苦酒吹內兩鼻孔中

又方灸鼻下人中一壯三愈不愈可加壯數也

### 又方灸鼻

又云治諸飛尸鬼擊走馬湯方

巴豆二枚 杏仁二枚 合綿裹椎令碎投樊湯二合

中自念入十出更自飲之口食下更老老



葛氏方治鬼擊病方

以淳苦酒ルル吹フ內兩鼻孔中

又方灸鼻下人中一柱五愈不愈可加炷數也

又方灸鼻

又云治諸飛尸鬼擊走馬湯方

巴豆二枚カラモツササネ杏仁二枚カラムツササネ合綿裹椎令碎投熨湯二合

中柏モヒネリ捻令汁出シメリ正白便與飲之如食頃下便老老

小量之

僧深方治鬼擊方

塩一升水二升和之攪マゼ令釋トカ作汁飲之令得吐則

愈良

新録方治鬼擊病方

鵲オホミナ莖汁灌鼻中如杏人許須臾差好

千金方治鬼擊病方

艾如鴨子大三枚ラミキ水五升モ煮取二升頓服之

又方灸膺上一寸壯又灸膺下一寸三壯

治客忤方第四

病源論云卒忤者三名客忤謂邪客之氣卒犯忤

人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂

魄魄ハル衰弱者則為鬼氣所犯喜於道間門外得之

葛氏方客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之

令人心腹絞痛ツク脹滿氣衝心胃不即治之致人治之方

以水漬粳米取汁三升飲之口已禁者以物強發

內之又方銅器若凡器盛熨湯先以衣三重

藉腹上乃舉湯器著衣上湯轉冷者去衣

器親炙大冷者易以熨湯取愈也



葛氏方容忤死者中惡之類也喜於道間門外得之

令人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即治之致人治之方

以水漬粳米取汁三升飲之口已禁者以物強發

內之又方銅器若凡器盛熱湯先以衣三重

藉腹上乃舉湯器著衣上湯轉冷者去衣

器親炙大冷者易以熱湯取愈也

又方搏書墨水和服一錢上

又方繩橫度其人口以度之齊去四面各一處灸

各三壯令四火俱起

又方灸鼻下人中卅壯令鼻柱下

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯

又云已死者搏生昌蒲根絞取汁含之立愈

千金方治容忤方

鹽八合水三升煮取一升半分二服得吐即愈

若小便不通筆頭七枚燒末水和服之即通

又方灸巨闕百壯

范汪方治容忤方

取牛子矢半杯以酒三升煮服之

新錄方治容忤方

鳩生艾心取汁灌口中五合

又水洩靛帶服之

治魔不寤方第五

病源論云人睡眠則魂魄外遊為鬼所厭鬼居其精神

弱者魔則久不得忤乃至氣暴絕所以須傍人助

愛并以方術治之乃獲也



鳩生艾心取汁灌口中五合

又水洩方靛帶服之アヲフ コシメヲ

治魔不寤方第五モウシラフハシ

病源論云人睡眠則魂魄外遊為鬼所モウシラフハシ魔屈其精神

弱者魔則又不得忤乃至氣暴絕所以須傍人助

受并以方術治之乃獲也

集驗方治卒魔欲死方

鳩生韭汁灌鼻孔中刺者并灌兩耳ハナシク

徐伯方治魔モ不寤方モ

取葱葉刺鼻中慎勿火照之ヒトモル

葛氏方云卧魔不寤勿以火照之ヒトモル致人但痛齧其

踵及足母指甲際而多唾其面治之方ツキヤキカケル

末皂莢以管吹カハラフチ內兩鼻孔中即起已三四日猶

可吹之 又方末竈中黃土吹カハラフチ兩鼻孔中

又方取韭菜搗以汁吹其鼻孔アチ冬月極根可咬ナラ

又方以筆毛刺鼻孔男左女右可展轉進之アハ

又方以牛若馬臨魔人上二百息セウ青牛尤佳セウナリ

又方末昌蒲吹鼻中末桂セウ內舌下

又方令一人坐頭首一人於戶外呼病者姓名坐人應ウヘ

日人諾在便即得獲也今案救急單驗方

又云喜魔及惡夢者方 枕真射香一子於頭邊セウ

又方帶雄黃男左女右

又方作犀角枕佳 又方以席頭為枕セウ

又方以青木香內枕中帶之

千金方治魔不寤方



日人諾在便即得禳也  
今案救急單驗方  
井中呼之

又云喜魔及惡夢者方 枕真射香一子於頭邊

又方帶雄黃男左女右

又方作犀角枕佳 又方以席頭為枕

又方以青木香內枕中帶之

千金方治魔不寤方

雄黃如棗大係左腋下令人終身不肯魔集

驗方固之 又方伏龍肝末吹鼻中

養性志云人魔勿燃火喫之魔死不疑 啗喫之吉但

得遠愛之不得近而急愛害失魂魄

救急單驗方療魔死方

引牛臨鼻少時即活 又方鷲其尾梅柏血甲際活

范汪方治魔死符法魔死不久故可活方

書此符燒令黑以少水和之置死人口懸鏡

死者耳前擊鏡呼死人不過半日即

生 魔 鬼 丹書之

新錄方若魔不悟者方

酒服駿灰一撮許 又方搗葫蘆根莖取汁煎之

治尸厥方第六

病源論云尸厥者陰氣逆也由陽脉卒下墜陰脉

卒上外陰陽雜居營衛不道真氣厥亂客邪

乘之其狀如死猶微有息而不恒脉尚動而形元

知也聽其耳內循々有如喘之聲而股間臍者

是也 葛氏方云尸厥之病卒死而脉猶動是也

以管吹其左耳自通三過復吹右耳三過即起



病源論云尸厥者陰氣逆也由陽脉卒下墜陰脉  
卒上外陰陽雜居營衛不道真氣厥亂容邪  
乘之其狀如死猶微有息而不恒脉尚動而形元  
知也个聽其耳內循々有如喘之聲ウツク而股間腠者アタカナル  
是也

葛氏方云尸厥之病卒死而脉猶動是也

以管吹其左耳自極三過復吹右耳三過即起

又方楊昌補以如棗核大著耳台下

又方灸鼻下人中七壯 又方灸豐中穴二七壯

又方灸陰囊下去大孔一寸百壯若婦人者灸兩乳之

中間

又方以昌補骨著鼻兩孔中吹之令入以桂屑

著台下云扁鵲治楚王法也已上二方集驗方

集驗方治厥死如尸不知人心下餘氣扁鵲灸法

以繩圍病人臂腕男左女右申繩從大椎上度下

之灸繩頭脊上五十壯

范汪方治尸厥方以梁上塵如豆著鼻中吹鼻中與耳同時

吹之 又方生薑汁灌口中

新錄方治尸厥方

取葱白一升水二升煮取一升頓服之

又方酒服桃人末方寸匕

救急單驗方尸厥死方

灸兩足大指甲後叢毛內七壯華他云二七壯

治溺死方第七

病源論云人為水所浸溺水從孔竅入灌注府藏其權南

故死若已極救得出即泄瀉其水令氣血得通便活

又云經半日及一日猶可活氣已絕心上獨亦可治之



又方酒服桃人末方寸匕

救急單驗方尸厥死方

灸兩足大指甲後叢毛內七壯華他云二十七壯

治溺死方第七

病源論云人為水所浸溺水從孔竅入灌注府藏其權肉

故死若已極救得出即泄瀉其水令氣血得通便活

又云經半日及一日猶可活氣已絕心上膈亦可治之

小品方治溺死已經二宿者可活方

搏皂莢作末以綿裹內死人下部中須臾牽出

即活也

又云治溺死方

以竈灰布著地令厚五寸以甑倒覆灰上以溺人

覆伏甑上口中水當出也覺水出復更別敷灰

令暖量之溺人口中水已出極多便去甑即

以暖灰壅溺人通身但出口鼻耳小時便蘇

醒則活也

又方令二健人抱溺人倒卧瀝溺人水出盡便活也

葛氏方溺死一宿者尚可活治之方

倒懸死人以好酒灌其鼻立活

又云身尚溫者

取竈中灰二石餘埋人從頭至足即活

又方便脫暖釜覆之取溺人伏其上腹中水出

便活

千金方治落水死方

酢灌鼻

又方裹石灰內下部中水盡出即活

又方但埋死人暖灰中頭足俱浸准用七孔

錄驗方治溺死方

灸膺中



又云身尚温者 取竈中灰二石餘埋人後頭至足即活

又方便脫暖金覆之取溺人伏其上腹中水出

便活

千金方治落水死方

酢灌鼻 又方裹石灰内下部中水盡出即活

又方但埋死人暖灰中頭足俱浸准用七孔

錄驗方治溺死方 灸膻中

集驗方治溺水死方

葵沙以覆死大使上下有沙但出鼻口中沙温

濕須易之

治熱暈死方第八

病源論云夏月炎熱人冒涉途路熱毒入内与五藏

相并容耶熾盛鬱疾不宣散卒絕陽氣暴奪經

絡不通故奄然悶絕謂之暈也然此乃外邪所擊

真藏未壞若便遇治救氣宣則蘇也夫熱暈不可

得冷、便死

葛氏方凡中熱暈死不可使卒得冷、便仍死矣治之方

以泥作甕繞暈人膺使三四人更溺其中

又方亦可屈草帶之可扣凡碗底若脫車缸

以著暈人膺上取令溺不得流去而已此道路窮

急元湯當令人溺若有湯便可以与之

又方干薑橘皮甘草末少、内熱湯中令稍、咽

勿頻多亦可煮之

小品方治中熱暈方

取路上熱塵土以壅其心上小冷復易之氣通乃心

又方偃卧暈人以草帶圍膺上令人溺膺中



急元湯當令人溺若有湯便可以与之

又方干薑橘梯皮甘草末少內熱湯中令稍二咽

勿頻多亦可煮之

小品方治中熱喝方

取路上熱塵土以壅其心上小冷復易之氣通乃心

又方偃卧喝人以草帶圍膺上令人溺膺中

即愈 又方濃煮藜飲之至三升良効

千金方治熱喝方

張死人口令通以暖湯徐徐灌口中世小舉死人

頭身令湯入腸須臾即蘇

又方灌地漿一盃即愈

又方把椅子若鷄著心前慰之世

又方地黃汁一盃服之

又方但以熱土及灰土壅其心上佳

治凍死方第九

病源論云人有在於途路逢凜風苦雨繁霜大雪衣

服氣霜濕冷氣入藏致令陰氣閉於內陽絕於外榮

衛結氣復不流通故致噤絕而死若早得救療而

溫氣通則生

又云凍死一日猶可治過此則不可治也

葛氏方治冬天墮水凍四肢直口噤未載有微氣方

以大器多熱灰使煖囊盛以薄其心上冷復

易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作

粥清稍含之即活若不先溫其心便持火

灸其身冷氣與火并則死勿為也

千金方救急  
車驗方皆同之



又云凍死一日猶可治過此則不可治也

葛氏方治冬天墮水凍四肢直口噤載有微氣方

以大器多熱灰使煖囊盛以薄其心上冷復

易心暖氣通目則轉口乃得開溫酒及作

粥清稍含之即活若不先溫其心便持火

灸其身冷氣與火并則死勿為也千金方救急  
車驗方皆同之

治自縊方第十

病源論云人有不得意至者多生忿恨性自縊以

繩物繫頸自懸挂致死乎為自縊

又云自縊死且至暮雅已冷必可治暮至旦則難治

此謂其晝則陽盛至氣易通也夜則感其氣難

通也

又云則夜短又契則易治

又云氣雅已斷而心微溫者一日已上猶可治

又方用罽衣覆其口鼻兩人吹其兩耳即生

小品方治自縊死方

傍人見自縊者未可輒割繩必可登物令及其頭即

懸牽頭緩舉其身起令繩微得寬也別使一人堅塞

兩耳勿令耳氣通又別使一人以葱葉刺其鼻中吹

令通又別使一人齧死人兩踵根待其蘇活乃止也

又方治自縊死慎勿割繩也繩卒斷氣頓泄去便死

不可復救也徐把死人漸縊令繩漸寬也然後解

下之心下尚溫取雞雌雄無在拔翅毛去勿令得飛

也置地逐之竟宅走雞令極久者其冠當黑心急

以尺物撥死人口開便牽雞頭上割雞冠斷取五



令通又別使一人醫死人兩踵根待其蘇活乃止也

又方治自經死慎勿割繩也繩卒斷氣頓泄去便死

不可復救也徐テ把死人漸ナラ縲上ル令繩漸寬也然後解

下之心シルセ下尚溫取雞雌雄無在拔翅毛ツマ去勿令得飛

也置地逐之シツ竟定走雞令極久ス者其冠當黑心急

以尺物撥死人口開便率雞頭上割雞冠セ折取五

臨死人口中至唯咽氣使通カシフ

### 千金方治自經死方

凡自經死勿截繩徐キル把解之心下尚溫者ナラ甕能覆其復又山鳥及聲類云一

口鼻兩人吹其兩耳救急單驗方同

### 又方藍青汁服之

又方梁上塵如大豆各內甬中四人各捉一甬同

時雨耳雨鼻即治

### 又云五絕方

一日自經二牆壁三日溺水四日魔魅云五日產乳

絕皆以半夏ホソクア一友細ユイ下篩丸如大豆內鼻中愈

### 集驗方治自經死方

搗皂莢カハフナキ細辛オウソクネクセ屑取ハカリシ如胡豆吹兩鼻孔中心タ車

用皂莢モ三好ウシ

葛氏方云自經死雖已久心下尚微溫ナラ猶可治也治之方

未皂莢以葱葉吹キ內其兩鼻孔中

又方以蘆管吹其兩耳ナ極則易入チ取活乃心若

氣通者少以桂湯稍ウメ咽徐ウメ乃以少粥清之

### 龍門方療自經死方

皂莢末如胡豆許吹兩鼻中ハナヒシ速即治

### 治諸病方第十一

嚏



未皂莢以葱葉吹內其兩鼻孔中

又方以蘆管吹其兩耳極則易入取活乃心若氣通者少以桂湯稍咽徐々乃以少粥清之

龍門方療自經死方

皂莢末如胡豆許吹兩鼻中嚏即活

治法病方第十一

病源論云凡注之言注也謂邪氣俱住人身內故名爲注此由陰陽失守經絡空虛風寒暑濕飲食勞倦之所致也或卒死之氣或卒犯鬼物之精皆能成此病其變狀多端乃至卅六種九十九種而方不皆顯其名也

僧深方云西王母玉壘赤丸備急治尸注卒惡水陸

毒螫方病方

武都雄黃一兩

赤如鷄冠八角大附子一兩

炮稱

梨蘆一兩

上丹沙一兩

不使有石者

白礬石一兩

練之

巴豆一兩

古法螫令紫色稱之

凡六物悉令精好先治巴豆三千杵次內礬石三杵次內梨

蘆治三千杵次內雄黃治三千杵次內白蜜治

三千杵之可從此更治万杵最佳有加真朱一兩者

若不用丹沙而內真朱二兩無在也生礬石黑礬石皆

可用不必白色者巴豆勿用兩人者又方別搗梨蘆

附子下後乃更稱之又一方每內藥輒治五百杵輒內

少蜜恐藥飛鴉都畢乃更治万杵合藥得僮子治

之更佳無僮子但凡人三日瘡或乃使之合藥用建

除日天清无雲霧日向月建藥成密之勿令泄著



若不用丹沙而内真朱二兩無在也生礬石黑礬石皆

可用不必白色者巴豆勿用兩人者又方別鵝梨盧

附子下後乃更稱之又一方每内藥輒治五百杵輒内

少蜜恐藥飛鵝都畢乃更治万杵合藥得僮子治

之不佳無僮子但凡人三日瘳或乃使之合藥用建

除日天清无雲霧日向月建藥成密之勿令泄著

清紫處大人服之皆如小豆但丸數之无常此藥

治万病无所不至方上雖不能具載故略說耳若本

病將服者禁食生菓生菜猪突腹服以下病者宿

勿食明旦服二丸不知者飲米飲以發之令下不

心飲冷水飲心之病在葛上吐葛下者下或但意氣

而愈或食寒不消腹堅脹或痛脹一丸立愈風病寒

疝心疝疝每諸疝發腹中急痛脹二丸積寒

熱者痞蛇病服二丸腹脹不得食飲服一丸卒苦

寒熱注來服一丸空開拾不得大小便欲死服二丸

痼結服一丸日三服取愈若後者射崗丸甚良下利重

下服一丸便斷或復天行下便斷卒上氣但出不入反

逆氣衝喉暴積聚者服二丸日無瘳未發服一丸已發

服二丸便斷小兒百病瘳寒中及有熱百日半歲者以一丸

如黍米著乳頭與服之下一歲以上服如麻子一丸日三服以飲

服小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成堅積皆令將

服一丸可以塗乳頭使小兒乳之傷寒勅色及時氣病以

燭酒服一丸厚覆取汗即愈若不汗復酒服一丸要

取汗欲行視病人服一丸以一丸著頭上行无所畏

至死喪家帶一丸辟百鬼病苦淋路痛瘦百第



如桑米著乳頭與服之下一歲以上服如麻子二九日三皆以飲

服小兒大腹及中契惡毒食物不化結成堅積皆令將

服一九二可以塗乳頭使小兒乳之傷寒勅色及時氣病以

燭酒服一九厚覆取汗即差若不汗復酒服一九要

取汗欲行視病人服一九以一九著頭三行无所畏

至死喪家帶一九辟百鬼病苦淋路痛瘦百第

酸疼服一九日三婦人產生餘疾及月水不通及未

注不時服二九日二卒霍亂心腹痛煩滿吐下手

足逆冷服二九注病百種病不可名將服二九

日垂若腹中如有虫欲鑽腸出狀急痛一心一作

此是風氣服二九若惡瘡不可名癰疥疽以膏

若好苦酒和藥先鹽湯洗瘡去痂拭令燥以藥

藥塗之即愈惡風遊心不得氣息服一九即

食耳出膿血汗及卒聾以穀裏裏二九塞耳

耳孔中即愈癰腫瘰癧瘰癧及欲作瘰以若

苦酒和藥塗之齒痛以小丸綿裏著齒孔中咋

之若寒熱注來服二九苦地黃蜂蝎蠅所中

及獠犬狂馬所咋以苦酒和塗瘡中并服二九

即愈卒中惡欲死不知人以酒若湯水和二九

強開口灌漿中捧坐令下若獨宿心林澤之中若

冢墓間燒一九百鬼走玄不敢近人辟飲而飲淡

飲服一九以臈和一九如彈丸著絳囊中以繫臂

男左女右山精鬼魅皆畏之中溪水毒服二九已

有瘡在身以苦酒和三四九塗瘡上憂患之氣結

在胃中苦連意及咳胃中刺痛服如麻子三九日

三愈婦人胃中苦滯氣、息不利小腹堅急繞臍



延開口灌漑中棒生令下若獨宿山林澤之中

冢墓間燒一九百鬼走之不敢近人辟飲而飲淡

飲脹一九以臈和一九如彈丸著絳囊中以繫臂

男左女右山精鬼魅皆畏之中溪水毒脹二九已

有瘡在身以苦酒和三四九塗瘡上憂患之氣結

在胃中苦連意及咳胃中刺痛脹如麻子三九日

三愈婦人胃中苦滯氣息不利小腹堅急繞臍

絞痛漿脹如麻子一九稍增之如小如豆心腹常苦痛

及中契脹一九如麻子曰三脹五日愈男女耶氣鬼

交通歌哭無常或腹大經絕狀如任身皆將脹三

丸如胡豆大日三夜一又以苦酒和之粉且以塗

年間使心主暮又夕以塗足三陰交及鼻孔七日

愈又將脹如麻子一九日三廿日心腹中三虫宿勿食

明平且進牛羊糞炙三膊頭更便服三丸如胡豆

日中當下車過日中不復脹二九必有爛虫下小兒

寒熱頭痛二契及虫見一脹一九如麻子小兒疳瘦

丁美不能食不化將脹二九日三又苦酒和如粉塗

塗兒腹良風目赤或痒視漠漫出爛皆以蜜

解如粉以塗住目此目皆頭卒風腫以苦酒若膏

和塗之即愈風頭腫以膏和塗之以絮裏之若

為蝱毒所中吐血腹內如如刺脹一九如麻子稍益

至胡豆亦以塗鼻孔中以膏和通塗腹背亦燒之

之自薰治鼠癢以脂和塗瘡取駁舌狗子苦之即

愈也

千金方治一切注無新方

先作卧灸兩乳兩邊耶下三寸第二助間隨年壯可



為蝮毒所中吐血腹內如刺脈一丸如麻子稍益  
至胡豆亦以塗鼻孔中以膏和通塗腹背亦燒之  
之自薰治鼠癭以脂和塗瘡取駁舌狗子苦之即  
愈也

千金方治一切注無新方

先作卧灸兩乳兩邊邪下三寸第二助間隨年壯可  
至三百壯又心下三寸灸六十壯又兩手大指頭灸七壯

又云十注丸主十種注氣注勞注鬼注冷注生人注死人注  
尸注水注食注土注等諸注方

注食注土注等諸注方

雄黃兩巴豆二兩 人參一兩甘草一兩蒿本一兩  
桔梗附子一兩 皂莢一兩枳一兩 麥門冬一兩

十味空腹服一丸如小豆日二以知為度有驗

葛氏方云注病即是五尸中之尸注又狹諸鬼耶為寔也

大略令人寒熱淋瀝沉不寐不知所苦與無處不

惡累年積月漸以至死後復注易傍人乃致滅門

覺似此疾者便宜急治之方

桃核人五十枚研之以水一斗煮取四升一服盡

當吐病不盡二三日更作若不吐者非注

集驗方治注病方

取桑根白皮切二斗曝燒作灰湯淋取汁浸小豆

斗如此取灰汁盡蒸豆熟作羊脂羹散此豆

又云治鬼注病相染易盡門方

獺肝一具乾之下篩水服方寸匕三神方 千金方同

樣要方療惡症入心欲死無問遠近年月皆愈方



集驗方治注病方

取來根白皮切二斗セウシ曝カクイチ燒ヒクセ作灰湯淋取汁浸小豆

斗如此取灰汁盡蒸豆クラハ熟作羊脂羹散此豆

又云治鬼注病相染易盡門方

獺肝一具乾之下篩水服方寸匕オソ三神方千金方同

槎要方療惡症入心欲死無問遠近年月皆愈方ル

安息香半兩為末酒服即愈救急單

又云療症氣莖無恒家方

白芥子カラシ搗為丸服之 又ヒ醢ヒ和塗隨手為驗

龍門方療惡症入心欲死方

獨頭蒜一枝書墨ヒトヒ如來大並鳩以醬汁一小合ヒ頓ヒ五卷

又方取塩如鷄子布裹燒赤末酒服吐即驗

又方取枳布裹薄布フセハシカフ庄上以熨斗フシ熨之モリ令汗出驗

新錄方云惡症方

塩五合カフアヤナワル竈裏三合水三升モ煮塩消去滓頓服吐ヒ老

又方桃枝切三升水四升モ煮取一升六合二服之

范注方治尸注毒痛注來方ヒ

燒髮灰杏子中人イリ焚令紫色

凡二物ヒ等膏和酒服梧子三九ヒ日三

救急單驗方療惡症方

阿魏藥服二升和酒五卷

又方桂三兩酒三升煮取一升ヒ再服老

治諸尸方第十二

病源論云人身內自有三尸諸虫與人俱生而此虫

忌惡能与鬼靈相通常接引外郎為人患害其發

後作之代元



救急單驗方療惡症方

阿魏藥脈二升和酒五老

又方桂三兩酒三升煮取一升八無脈老

治諸尸方第十二

病源論云人身內自有三尸諸虫與人俱生而此虫

忌惡能与鬼靈相通常接引外郎為人患害其發

發作之狀或沉、默、不的知所苦或腹<sup>腹</sup>痛脹急或

螺塊<sup>ラ</sup>踊起或牽引腰脊或精神雜錯變狀多端

葛氏方云雖有五尸之名其例皆相似而小有異者

一飛尸<sup>變作</sup>二道尸<sup>無常</sup>三風尸<sup>得風</sup>四沉尸<sup>遇寒冷</sup>

五尸經<sup>變轉致</sup>大惡

又云凡五尸即是身中尸鬼接引外推共為病害經術

其有消滅之方而非世徒能用今度撰諸經要以救其

弊方

雄黃一兩大蒜一兩搏令相和如彈丸者內二合熱酒中

服之須更差未老更一服便心<sup>心</sup>有尸<sup>尸</sup>疥者常宜<sup>タツク</sup>此

藥也

又<sup>玄</sup>桂干薑人等末之塩三指撮放令青末合水服

二方寸匕

新錄方治飛尸方

灸脊中及兩旁<sup>ハ</sup>相去三寸各五十主

又方桃白皮切二升水四升<sup>モ</sup>煮取一升六合<sup>合</sup>分三服

又云治道尸方

牛蹄<sup>ヒツメ</sup>下土三指撮酒一盞下<sup>之治風尸</sup>

又方燹艾以青布裹更耐<sup>カヒ、マセ</sup>又方燹大豆裹更耐

又云台虎方



新録方治飛尸方

灸脊中及兩旁相去三寸各五十主

又方桃白皮切二升水四升煮取一升六合分三服

又云治道尸方

牛蹄下土三指撮酒一盞下治風尸

又方燹艾以青布裹更熨又方燹大豆裹更熨

又云治沉尸方

灸大倉七壯 又灸乳下一寸七壯

又方鬚灰杏仁蜜和丸如梧子一服七九日二

千金方治道尸方

桂心一兩 干薑二兩 巴豆人二枚

三味下篩上酢和如泥塗病上干即易之

又云芥子薄主道尸飛尸方

芥子一升蒸熟搗下篩以黃丹二兩攪之入作餅

布帛盛之更蒸便熨薄痛上當更迭蒸帛恒

恒便熨

治諸瘡方第十三

病源論云夏日傷暑秋必病瘡其人形瘦皮栗

以月一日放當以十五日愈設不愈月盡解

後瘡哉

通云云瘡病多種各不同形有溫瘡有寒瘡有癰

疔有勞瘡有鬼瘡此五瘡內應於五藏溫瘡者先熱

而後寒、瘡者先寒而後熱瘡瘡者吐涎嘔宿汁

腹中生絃瘳勞瘡者不得用力鬼瘡不可與飲食用

用藥不得同

集驗方黃帝曰夫瘡瘡皆生於風夏傷於暑秋為瘡

病源論云  
瘳氣在腸  
助之同法豆  
而起瘳瘳  
則引腸下  
瘳瘳所引  
謂之瘳瘳



通云云庖病多種各不同形有溫庖有寒庖有癰

庖有勞庖有鬼庖此五庖內應於五藏溫庖者先熱

而後寒、庖者先寒而後熱癰庖者吐逆嘔宿汁

腹中生絃癰勞庖者不得用力鬼庖不可與飲食用、

用藥不得同

集驗方黃帝曰夫瘡瘡皆生於風夏傷於暑秋為瘡

瘡問曰瘡先寒而後熱何也對曰夫寒者陰氣也風者

陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也問

曰先熱後寒者何對曰先傷於風而後傷於寒故先熱

而後寒也名曰溫瘡其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣

獨發名曰痺瘡

治之方夫庖必從四末始先其發時一食項用細左藥繩

緊

東其手足十指遇時乃解

又方取大蜘蛛一枚內蘆管中塞管口繩

係以縮頸過發時乃解去

又方桃葉二七枚安心上艾葉葉上十四壯

千金方治瘡方

未發前把雄雞一頭著懷中時驚動令雞

作大聲無不老

又方故鞋底玄雨頭燒灰井花水服之

葛氏方治瘡病方

多煮豉作湯飲數升令得大吐便斷

又方破一大豆玄皮書一斤作日字一斤作月字

病源論云  
瘡氣在腸  
助之同法  
而起於  
則引腸下  
瘡痛所引  
謂之瘡

宿汁  
瘡瘡  
瘡瘡  
瘡瘡



作大聲無不老

又方故鞋底玄雨頭燒灰井花水服之

又方未發前預灸項大椎尖頭漸灸過時心

葛氏方治瘧病方

多煮又方或作湯飲數升令得大吐便斷

又方破一大豆玄皮書一斤作日字一斤作月字

左手持日右手持月吞之立愈向日服勿令人

知之

又方灸鬲甲鳩末酒服方寸匕至發時令

三服兼用火灸无不斷

龍門方療一切瘧方

取恒山甘草等分鳩末和水服方寸匕吐即差

又方取蓮鳩末三指撮以酒和欲發前服之驗

范注方治瘧方臨發時鳩大附子下篩以苦酒和之

塗背上

廣濟方療瘧方

恒山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發

前頓服之發吐差以无所禁忌

小品方斷瘧瘧先大寒後大熱者方

小麦一升淡竹葉一席口恒山三兩

凡三物以水五升宿漬明且煮取二升半分

三服之

僧深方治一切諸瘧無不斷恒山丸方

大黃一兩一方二兩附子一兩一方二兩恒山三兩一方二兩龍骨一兩

凡四物治令下篩蜜和平且服梧子七丸未



小麦一升クレタケ淡竹葉一席口恒山三兩

凡三物以水五升宿漬明且煮取二升半

三服之

僧深方治一切諸瘧キ無不斷恒山丸方

大黃一兩一方附子一兩二兩恒山三兩クセキ龍骨一兩

凡四物治令下篩蜜和平且服梧子七丸未

發中間復服七丸臨發服七丸若不斷至後

後日復發更服如此法甚神良

本草經云治瘧者モソラ煮藥草汁及生汁服之

本草替疑云治瘧燒猫屎ネコ為末酒服方寸匕

治鬼瘧方第十四

范汪方治鬼瘧方

丹書額言戴九天書臂言杞九地書足言履九江

書背言南有高山上有大樹下有不流之水中

有神虫三頭九尾不食五穀但食瘧鬼朝食三千暮

食三百急如律令書脅言上高山望海水天門

亭長捕瘧鬼得便斬勿問罪急如律令

產經  
同之

又云平旦發者市死鬼恒山クセキ主之服藥訖持刀

食時發者オホシ鎰死鬼シコク蜀木主之服藥訖持索

日中發者オホシ溺死鬼ヌク大黃主之服藥訖持盆水

晡時發者舍長鬼カッネ麻黃主之服藥訖持磨衡

黃昏發者婦人鬼アララネ細辛主之服藥訖持明鏡

夜半發者厭死鬼ヒシ黃芩主之服藥訖持車軟

鷄鳴發者小兒鬼オウ附子主之服藥訖持小兒墓上折

草木



食時菰者<sup>ヌル</sup>蠶死鬼<sup>オホシ</sup>蜀木主之服藥訖持索

日中菰者<sup>ヌル</sup>溺死鬼<sup>オホシ</sup>大黃主之服藥訖持盆水

晡時菰者舍長鬼<sup>カッネクセ</sup>麻黃主之服藥訖持磨衡

黃昏菰者婦人鬼<sup>アラウネクセ</sup>細辛主之服藥訖持明鏡

夜半菰者厭死鬼<sup>ヒナシキ</sup>黃芩主之服藥訖持車軟<sup>トシキア</sup>

鷄鳴菰者小兒鬼<sup>オウ</sup>附<sup>オウ</sup>承主之服藥訖持小兒墓上折

草木

凡七物各一八治下後菰時加所主病藥一八當菰

日從旦至菰時溫酒服方寸匕三服訖必持所主病

物甚良有効

又云平旦作者客民鬼也<sup>オコル</sup>先作時令病者持衣如辭<sup>タル</sup>

去言欲遠出立愈

食時作者客死鬼也先作時令病者辭言欲歸之大道

上橋梁下逃之<sup>ニホリ</sup>

禺中作者市死鬼也先作時令病者<sup>セ</sup>結<sup>キタヤ</sup>棧北向吐

<sup>此字誤</sup>營<sup>ウクル</sup>以<sup>ウクル</sup>埃<sup>ウクル</sup>

日中作者溺死鬼也先作時令病者取盆水中著庭南向坐

營<sup>ウクル</sup>以<sup>ウクル</sup>埃<sup>ウクル</sup>

日<sup>チリ</sup>跌作者已死鬼也先作時令病者言吏捕汝庭中

晡時作者自經死鬼也先作時令病人當棟下卧以繩索<sup>カメウ</sup>

絹病者頭日入作者人奴舍長死鬼也先作時令病者

磨<sup>カラ</sup>碓<sup>ウシ</sup>問<sup>ウシ</sup>逃<sup>ウシ</sup>之

黃昏作者盜死鬼也先作時令病者踰去遠<sup>ニホリ</sup>已無令

人知其家人定作者小兒鬼也先作時病者取小兒墓

上折草木立愈夜過半作者囚死鬼也先作時取司

害<sup>アヤシ</sup>械<sup>アヤシ</sup>笈<sup>アヤシ</sup>令病者持之因從出可榜<sup>ウチ</sup>答<sup>ウチ</sup>汝者



晡時作者自經死鬼也先作時令病人當棟下卧以繩索  
縊病者頭日入作者人奴舍長死鬼也先作時令病者  
磨碓間逃之

黃昏作者盜死鬼也先作時令病者踰去遠已無令

人知其家人定作者小兒鬼也先作時病者取小兒墓

上折草木立愈夜過半作者囚死鬼也先作時取司

害械笈令病者持之因從出可榜笞汝者

夜半作者寒死鬼也先作時令病者溫衣營以埃持

桃枚飲食匪由中無人知見紫此次上

鷄鳴作者乳死鬼也先作時令病者犯菓席之菰

目應令持桃枚營以埃

如意方治鬼瘡方

發日早且取井花水丹書額作天獄字書脅作

脅獄字書背作背獄字左手作左獄字右手

作右獄字兩足心各作地字畢向東咒云日出

東方隱似沒晝鷄日夜罵月瘡鬼不死當復

紋清冷之鬼飲汝血北斗七星何不截急之如

律令三過咒便愈

又方計菽日今夕可食鷄鳴起著承履屨屨

隨意出戶脫之速出勿顧入幽閑隱室堅閉戶

勿令人知脫人來呼勿應過時勿飲食飢

極但卧忍之至夕乃還必斷也

通玄玄鹿者或間或頻日菽作無時者此為鬼患任

避之乃用飲食送遣如三日不心用

恒山三蒲豉一升秫米百粒蘇七斤研清酒

二升漬之一宿早且服之得大吐則心



勿令人知脫人來呼勿應過時勿飲食飢  
極但卧忍之至夕乃還必折也

通玄云鬼者或間或頻日發作無時者此為鬼虐任  
避之乃用飲食送遣如三日不用

恒山三兩 豉一升 秫米百粒 蘇七斤 研清酒  
二升漬之一宿早旦服之得大吐則止

治溫瘧方第十五  
病源論云夫溫瘧與寒瘧安含溫瘧者得之冬中

於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪  
邪氣不能出目遇大暑髓消鑠脈肉消釋

理發泄故先熱而後寒名曰溫瘧  
治寒瘧方第十六  
病源論云寒瘧此由陰陽相并陽虛則陰勝

勝則寒發於內而并於外所以內外俱寒故病  
發但戰慄而數顫

通玄云寒瘧者瀉之而惡寒毛豎發則引溫而少  
契方

朱沙四升 雄黃一升 研人參四升 恒山五升

牡蠣四升 蜜丸如梧子一服七丸日再空腹  
服之用粥飲之

治淡實瘧方第十七  
病源論云謂病人胃氣先有停淡結實目感瘧病  
則令人心下支滿氣煩隘之

范汪方治瘧淡實不消恒山湯方  
恒山六升 甘草四升 知母三升 麻黃三升 大黃四升



服之用粥飲之

治淡實癰方第十七

病源論云謂病人胃氣先有停淡結實目感癰病  
則令人心下支滿氣煩隘之

范汪方治癰淡實不消恒山湯方

恒山六分 甘草四分 知母三分 麻黃三分 大黃四分

凡五物切以水五升煮取二升分三服至效時令盡

治勞瘵方第十八

病源論云凡瘵積久不老者則表裏俱虛容邪未散真  
氣不復故疾難解問小勞便效

集驗方治勞瘵時不斫衆治無効此方治之

生長大牛膝一大束口切以水六升煮取二升分

再服第一服取未效前一食頃第二服取臨發

今案葛氏方云酒  
三升漬一宿分三服

葛氏方云老瘵久不斫方

末龍骨方寸匕先煮一時以酒一升半煮三沸及

契盡服溫覆取汗五愈

又方炙蟬甲鳩末酒服方寸匕至效時令三服兼

用火炙無不斫也

僧深方治勞瘵桃菜湯方

桃菜十四枚 恒山四兩

凡二物酒二升漬一宿露著中庭刀著器上明且

菰日凌晨漉去滓後溫令煖一頓服之必吐良

治嶂瘵方第十九

病源論云山嶂瘵此病生於嶺南帶山嶂之氣也其

伏寒熱木下有時皆由失氣原山嶂瘵氣也其



僧深方治勞瘵桃菜湯方

桃菜十四枚 恒山四兩

凡二物酒二升漬一宿露著中庭刀著器上明且  
菰日凌晨漉去滓ハツクラカスニシタア後溫令煖一頓服之必吐良

治瘰癧方第十九

病源論云山嶂瘰此病生於嶺南帶山嶂之氣也其  
狀寒熱休作有時皆由快溪源嶺嶂毒氣故也其病  
重於傷暑之瘰ナリモ

耆婆方治瘰癧要方

蜀恒山三兩 甘草二兩 光明砂一兩

三種檇篩以蜜寒和丸如梧子未發前服三丸發  
時服二丸發後服一丸於後三日更服一服三日慎食

錄驗方治瘰及嶂氣方

恒山二兩 甘草二兩 切以白酒大一升浸一宿去滓

二服未發前一服臨發又一服任吐慎生冷酢滑酒

宗通油膩房室

治間日瘰方第廿

病源論云間日瘰此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時  
相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行  
遲不能與衛氣偕出是以間日而作

集驗方治瘰或間日發或連發者方

秫米百粒 石膏八兩 恒山三兩 竹葉三兩

凡四物切以水六升漬藥覆一宿明且者取取二升分

三服取未發前一食頃第一服取臨發第二服當一

日勿洗手足面及嗽口勿進食飲取過時不發乃澡

洗進食也并用餘藥汁塗五心及胸前頭面藥滓



集驗方治虎或間日發或連發者方

秫米百粒 石膏八兩 碎 恒山三兩 竹葉三兩

凡四物切以水六升漬藥覆一宿明旦煮取取二分  
三服取未發前一食頃第一服取臨發第二服當一  
日勿洗手足面及嗽口勿進食飲取過時不發乃澡  
洗進食也并用餘藥汁塗五心及胸前頭面藥滓  
置頭邊此方從來舊用神驗

小品方斷癰恒山酒方治瘡癰先寒戰動地寒解壯熱

日タ發間日發並斷方

癰甲一兩 淡竹葉切三升 恒山三兩 甘草三兩 酒三  
升凡五物以酒漬藥刀景上覆頭安露地明旦以水  
七升煮取三升分五服未發前令盡當吐極傷  
多不必盡劑但禁飲水粽

治連年癰方第廿一

范汪方治連年癰不差牛膝酒方

牛膝草一杷好酒三升凡二物牛膝內酒漬一宿明旦分  
三服

錄驗方恒山治癰十歲廿歲方

恒山二兩 甘草一兩 大黃二升 桂心六銖  
凡四物切以恒山酒漬一夜諸藥以酒三升水二升煮  
取七合頓服下吐愈

僧深方治廿年癰龍骨九神方

龍骨四升 恒山八升 附子三升 大黃八升  
凡四物各治後鷄子和發前服十九如大豆臨發  
服七丸



凡四物切以恒山酒漬一夜諸藥以酒三升水二升煮  
取七合頓服下吐愈

僧深方治卅年癰龍骨丸神方

龍骨四升 恒山八升 附子三升 大黃八升

凡四物各治後鷄子和後煎服十九丸如大豆臨菟

服七丸

効驗方治卅年癰恒山散方

恒山五升 干漆四升 牡蠣二升 杏子八二升

凡四物下後酒服方寸匕日三

治菟作無時癰方第廿二

病源論云夫衛氣一日一夜大會於風府則湊理開

則邪入之則病作當其時陰陽相并隨其所勝負

則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪內外失

守邪氣妄行所以休作無時

葛氏方治瘡菟作无常心下煩熱方

恒山二兩 甘草兩半 豉五合 以水六升煮取二

升分再服當快心仍新即飲食

傷寒證候第廿三

病源論云經云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰

寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子

固密則不傷於寒夫觸冒者乃為傷於四時之氣

皆能為病而以傷寒為毒者以其最為致厲之氣

焉即病者為傷寒不即病者其寒毒藏肌膚中至

春變為溫病夏變為暑病者熱重於溫也是以

辛苦人春夏必有必有溫病者皆由其冬時觸冒之



寒此則四時心氣之序也。冬時嚴寒，萬類深藏。君子固密，則不傷於寒。夫觸冒者，乃為傷於四時之氣。皆能為病。而以傷寒為毒者，以其最為致厲之氣。焉。即病者為傷寒，不即病者其寒毒藏肌膚中，至春變為溫病，夏變為暑病。者，熱重於溫也。是以辛苦人春夏必有必有溫病者，皆由其冬時觸冒之所致。非時行之氣也。其時行者，是春時應溫而反寒，夏時應熱而反冷，秋時應涼而反熱，冬時應寒而反溫。非其時而有其氣，是以一歲之中，病無長少，多相似者，此則時行之氣也。

又云：夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日間，其愈皆以十日以上。

葛氏方云：傷寒時行溫疫，雖有三名，同一種耳。而原本小異。其冬月傷於暴寒，或疾行力作，汗出得風，冷至春夏，發名為傷寒。其冬月不甚寒，多暖氣，及西南風使人骨節緩墮，受耶至春夏，發名為時行。其年歲月中有厲氣，**藥**扶鬼毒，相任名為溫疫。如此証候，並相似。又貴勝雅言，總名傷寒。世俗同呼時行。道術并初言五溫之度，以此致大歸終，是共途也。

醫門方云：凡傷寒病五六日而渴欲飲水，不能多，未宜與也。所以介者，腹中熱尚少，不能消之，便作病矣。至七八日大渴欲飲水，然當與之。常令不足，勿極意云。能一斗而與五升者，飲而腹滿，小便不利，若喘者，藏邪不可與之。戰然大汗出，是為已愈也。凡得此病，又能飲水，此為欲愈之候。若小渴而強與之，目此成禍者，其數甚衆。

濕痺  
汗出也

傷寒不治候第廿四



醫門方云凡傷寒病五六日而渴欲飲水不能多未宜與

也所以介者腹中熱尚少不能消之便作病矣至七八日

大渴欲飲水然當與之常令不足勿極意云能一斗而

與五升若飲而腹滿小便不利若喘若臧所不可與之

戰然大汗出是為已愈也凡得此病又能飲水此為欲

愈之候若小渴而強與之目此成禍者其數甚衆

傷寒不治候第廿四

葛氏方云陽毒病面目斑々如錦文使咽痛下體膿五日

不治死

陰毒病面目青舉脊疼痛使咽不利手足逆冷五日不

治死毒病發赤斑一死一生

熱病未發汗而脉微細者死

內契脉盛躁發汗求不肯出者死

汗雖出至足者猶死

已得汗而脉猶躁感契不退者死

汗出而誠言煩躁不得卧目精乱者死

汗不出而喘而者死汗出大下利不止者死

汗出而寒不止鼻口冷者死發契而症腰掣縱齒

斷者死不得汗而掣縱狂走不食腹滿胃背痛臨

血者死

喘滿誠言直視者死契不退目不明舌本爛者死

欬而衄者死大衄不止腹中痛短氣者死

噎咳下血身契而大瘦削者死

手足逆冷而煩躁脉不至者死

大下利而脉赤及寒者死下利而腹滿痛者死下利



面者死

喘滿誠言直視者死 熱不退目不明舌本爛者死

欬而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

噎而衄者死 大衄不止腹中痛短氣者死

手足逆冷而煩躁脈不至者死

大下利而脈疾及寒者死 下利而腹滿痛者死下利

手足逆冷而煩躁不得眠者死

腹滿腸鳴下利而四肢冷者死 利心眩者死

腹脹嗜飲食而不得大小便者死

身面黃腫舌卷身糜臭者死

不知痛處身面青龍不欲語者死

目匡陷不見人口干譟語手脩衣縫不得眠者死

始得使一身不收口干舌焦者死

疾始一日腹便滿身熱不食者死 二日口身熱舌干者

死 三日耳聾陰縮手足冷者死

四日腰下至足熱而上冷腹滿者死 五六日六氣息高

者死

七八日脈微干而溺血口干者死

脈若不數三日中當有汗若无汗者死

大素經熱病死候九

第一汗不出不大泄發者死 第二泄而腹滿甚者死

第三目不明熱不已者死 第四者耆老人嬰兒熱而腹滿者死

第五汗不出欬而者死 第六舌本爛不已者死

第七欬而汗不出不心死 第八髓熱者死

第九熱而瘕者死



大素經契病死候九

第一汗不出、不大灌發者死 第二泄而腹滿甚者死

第三目不明契不已者死 第四者耆老人嬰兒契而腹滿者死

第五汗不出、欬而者死 第六舌本爛不已者死

第七欬而汗不出、不心死 第八髓契者死

第九契而症者死

避傷寒病方第第壹

靈奇方避時氣疫痢法

正月未日夜以蘆炬火照井及廁中百鬼走不八

又法正月朔日寅時用黃土塗門扉方二寸

又法用牛矢塗門戶方負二寸

又法正月且若十五日投麻子小豆各二十七枚入於井中

又法正月且吞麻子小豆各二十七枚辟去溫鬼

又法庚辰日取鷄犬毛於門外燒烟之避溫疫

又法五月十五日：中取井花水沐浴

避邪鬼

又法五月戊己日沐浴避病

又云使溫病不相易法以繩度所

住戶中屈繩燒斷

醫門方避溫疫法

赤小豆五合以新布五寸裹內井中不至底少許

三日清之平晨東向男吞二十七女吞一十七病者同

床不相染

又云療溫病轉相注易乃至戚門傍至外人無有

看脹此藥必不相易方



醫門方避瘟疫法

赤小豆五合以新布五寸裏內井中不至底少許

三日清之平晨東向男吞二七女吞一七病者同

床不相染

又云療溫病轉相注易乃至戚門傍至外人無有

者服此藥必不相易方

鬼箭羽二兩鬼目二兩赤小豆二兩 丹參二兩

雄黃二兩博節蜜丸如梧子服一九日二

三与病人同床傳衣不相染神驗

千金方云溫病時行令不相染方

立春後有庚子曰溫蕪菁菹汁合家大小並服

不限多少

又方常以月望日細剉東行桃枝煮湯浴之

又方桃樹蠹矢末水服方寸匕

得富貴方云欲至病人家手中作鬼字

玉箱方云屠蘇酒治惡氣溫疫方

白朮桔梗 蜀椒桂心 大黃 烏頭校楔 防風

凡八物細切緋帛盛以十二月晦日日懸沉井中勿令至泥

正月朔且出藥置三升溫酒中屠蘇之向東戶飲之各

三合先從小兒起一人服之一家無病一家飲之一黑丸

悉飲藥三朝還置井中仍歲飲之累代無患

葛氏方云老君神明白散避瘟疫方

白朮二兩桔梗二兩半 烏頭一兩附子一兩 細辛二兩

凡五物搗篩歲旦以溫酒服五八二家有藥則一里

無病帶是藥散以行所經過病氣皆消若他人有

得病者更置首服一方寸二



三合先從小兒起一人服之一家無病一家飲之二黑丸  
悉飲藥三朝還置井中仍歲飲之累代無患ヤフヒ

葛氏方云老君神明白散避瘟疫方

白朮二兩桔梗二兩半烏頭一兩附子一兩細辛二兩  
凡五物搗篩歲旦以溫酒服五八二家有藥則一里  
無病帶是藥散以行所經過病氣皆消若他人有  
得病者便溫酒服一方寸匕

又云度嶂散辟嶂山惡氣若有黑霧鬱鬱數及西南溫  
風皆為疫癘之候方

麻黃五カウネクセ八蜀椒五フセハシカ八烏頭二細辛一八防風一八  
桔梗一八干薑一八桂心一八白朮一分

凡九物搗篩平旦以溫酒服一錢上

又云折溫病令不相染著法

折キ汲水ツルヘラシ綆長七寸ヒソカ盜著病人卧席下集驗方

又方密以艾灸病人床四角各一丸勿令病人知之

又方以薤フナ葉密置病人卧席下勿令知之

又方附子三枚小豆七枚令女人授井中

治傷寒用萬方第廿六

葛氏方治時行垂死者破棺千金湯方

苦參一兩吹咀以酒二升煮令得一升半蓋脹

當吐毒千金方

本草蘘葭注古人采乾者燒之炅絕水漬飲汁名

破棺湯也主傷寒熱毒今案葛氏方世人謂之黃龍湯

耆婆方治熱病困苦者方

生麥門冬小一升去心搗碎炅內井花水絞取一升  
半及冷八三服熱甚者吐即老



當吐毒 千金方

本草蘘葂歌注古人采乾者燒之烟絕水漬飲汁名

破棺湯也主傷寒熱毒

今案葛氏方世人謂之黃龍湯

耆婆方治熱病困苦者方

生麥門冬小一升 去心搗碎クタイ 越內井花水絞取一升

半及冷入三服熱甚者吐即老

集驗方云凡除熱解毒無過苦酢之物

崔禹錫食經云梨除傷寒時行為妙藥也

通玄經云梨稚為五藏刀斧足為傷寒妙藥云々

治傷寒一二日方第廿七

病源論云傷寒一日大陽受病大陽者小腸之經也

故先受病其脉絡於腰脊至於頭項故得病一日而

頭項腰脊痛也以下次第如常

葛氏方云傷寒有數種庸人不能別今取一藥兼治

治者若初舉頭痛寒熱脉洪起一二日便作此葱豉湯

葱白一席口豉一升以水三升煮取一升頓服取汗

集驗方小兒

尿三升

又方葛根四兩 水一斗煮取三升 內豉一升煮大

取升半一服

又方搗生葛根汁服一二升佳

治傷寒三日方第廿八

新錄方治傷寒溫疫三日內脉洪浮頭痛惡寒熱身

體痛者方

葱白一升 豉一升 艾子三七枚 桂心二兩 無用生

薑三兩 以水七升煮取二升 分三服之



又方鵲生葛根汁服一二升佳

治傷寒三日方第廿八

新錄方治傷寒溫疫三日內脈洪浮頭痛惡寒~~甚~~身  
體痛者方

葱白一升 豉一升 艾子三七枚 桂心二兩 無用生

薑三兩 以水七升煮取二升 分三服之

治傷寒四日方第廿九

玉箱方傷寒四日方

葳蕤二七枚以水一升煮取五合一服當得吐之

治傷寒五日方第卅

范汪方治傷寒五六日嘔而利者黃芩湯方

黃芩三兩 半夏半升 人參二兩 桂心二兩 干薑

三累 大棗十二枚 凡六物水七升煮得二升 分三服

通玄云五日外內涼內熱者寫之宜服升麻湯方

升麻二兩 黃芩三兩 艾子二兩 大青二兩 大黃二

兩 別以芒消三兩 水八升煮取二升 分三升

服如不利盡服之

治傷寒六日方第卅一

范汪方治傷寒六七日不大便有瘀血方

桃人廿枚 大黃三兩 水蛭十枚 蟅虫廿枚

凡四物鵲篩為四丸卒服當下血不下復服之

治傷寒七日方第卅二

千金方傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表俱熱時

惡風大溫舌上干而煩飲水數升白散湯方

母六兩 石膏一升 甘草二兩 粳米六合



桃人廿枚モウサネ 大黃三兩オウゴン 水蛭十枚スイ 蜜耑廿枚ミツクサ

凡四物鳩篩為四丸卒服當下血不下復服之

治傷寒七日方第廿二

千金方傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表俱熱時

惡風大溫舌上干而煩飲水數升白散湯方

母六兩モ 石膏一升セキ 甘草二兩カンサウ 粳米六合ネ

四味水一斗二升モ煮米熟去滓入服一升日三

葛氏方若已六七日熱盛心下煩悶狂言見鬼欲起者

方絞糞汁飲數合至一升世人謂之為黃龍湯陳

父者弥佳

治傷寒八日方第廿三

錄驗方治傷寒八九日腹滿外內有熱心煩不安其胡湯方

蜣母二兩ヤトモ 生薑三兩ショウキョウ 薤白三兩セリソウ 黃芩八兩ワウコン 大黃三兩ダイオウ

黃芩二兩ワウコン 甘草一兩カンサウ 人參一兩ニンジン 半夏二兩ハンシャ

來螺蛸七枚オホナカワタリ

凡十物切以水一斗モ煮得三升溫飲一升日三

治傷寒十日以上方第廿四

千金方治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸熱

不除及下利不止皆治之本

大青四兩ハトクセ 甘草二兩カンサウ 阿膠二兩アコ 豆豉一升マメ

四味以水八升煮取三升頓服一升日三

治傷寒陰毒方第廿五

集驗方云陰毒者或傷寒初病一二日便成陰毒或腸藥

六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛

喉咽不利毒氣攻心下重短氣不得息逆差昏



不陽及下利不心胃治之

大青四兩 ハトクモ 甘草二兩 阿膠二兩 豆豉一升

四味以水八升煮取三升頓服一升日三

治傷寒陰毒方第廿五

集驗方云陰毒者或傷寒初病一二日便成陰毒或腸藥

六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛

喉咽不利毒氣攻心之下強短氣不得息逆逆脘

青面里四肢厥冷其脉沉細緊數此陰毒候身

如被打五日可治七日不治方 醫門方同之

甘草二兩 オホセリ 升麻二兩 トリフアシクモ 當歸一兩 オホセリ 蜀椒一兩 フサハシカア

斂甲四兩

凡五物以水五升煮取二升半分服三行五里

復脹溫覆中毒當汗則愈若不汗病除

重服之

治傷寒陽毒方第廿六

集驗方云陽毒者或傷寒一二日便成陽毒或服藥

吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安面

赤狂言或走或見鬼或下利其脉浮大數面斑

如錦喉咽痛下體面五日可治七日不治方 醫門方同之

甘草二兩 オホセリ 當歸一兩 オホセリ 蜀椒一兩 オホセリ 升麻二兩 オホセリ

雄黃二兩 桂心一兩

凡六物以水五升煮取二升半分服三行五里

須復脹溫覆手足中毒則汗則解不解重

作今世有此病此二方實未經用

治傷寒汗出後不除方第廿七



甘草二斤當歸一斤 蜀椒一斤 升麻二斤

雄黃二斤 桂心一斤

凡六物咬咀以水五升煮取二升半分三服行五里

須腹脹溫覆手足中毒則汗汗則解不解重

作今世有此病此二方實未經用

治傷寒汗出後不除方第廿七

集驗方大汗出後脈猶洪大形如瘧日一發汗出便解方

桂心一兩十六銖夕藥一兩 生薑一兩 甘草一兩

大棗十四枚 麻黃一兩去節 杏仁廿三枚

凡七物切以水五升先煮麻黃再沸下諸藥煎

得一升八合服六合

治傷寒鼻衄方第廿八

千金方云傷寒鼻衄腸間有餘熱故也熱困自心不

者方

杜厲十八左顧者石膏五斤右二味酒服方寸匕先食日

三四凡亦可用一方以漿服之集驗方同之

僧深方治熱病鼻衄多者出血一二斛方

補黃五合以水和一飲盡即愈不差別依諸方

又方燒牛真作灰服方寸匕又方以冷水洗佳

治傷寒口干方第廿九

集驗方治傷寒熱病口干喜唾方

干來棗廿枚烏梅十枚

二物合搗蜜和含杏核大咽其汁

治傷寒藥血方第卅

范汪方治熱病藥血方



治傷寒口干方第卅九

集驗方治傷寒熱病口干喜噦方

干來來廿枚碎 烏梅十枚碎

二物合搗蜜和含杏核大咽其汁

治傷寒藥血方第卅

范汪方治熱病藥血方

白茅根一物搗下篩為散方寸匕日三服可絞取汁

飲之

治傷寒吐方卅一

集驗方治傷寒吐虛羸欲死方

鷄子十四枚以水五升煮取二升乃內豉四合復煮

兩三沸去豉八再服之

治傷寒歲方第卅二

病源論云傷寒所以歲者胃中虛冷故也

葛氏方治傷寒宛不下方

甘草三兩橘皮一升水五升煮取一升頓服之日三四

小品方云春夏時行寒毒傷於胃冷宛方

白茅根切一升橘皮二兩桂心二兩葛根二兩

凡四物以水六升煮取三升分三服之

救急方云天行後干嘔若歲手足冷方

橘皮四兩生薑半斤右以水七升煮取三升分四

五服立驗

治傷寒後臨方第卅三

集驗方治傷寒後干嘔不下食蘆根飲方

生蘆根切一升青竹茹一升粳米三合生薑二兩切



救急方云天行後干瀉若歲手足冷方

橘皮四兩 生薑半斤 右以水七升煮取三升分四

五脈五驗

治傷寒後瀉方第卅三

集驗方治傷寒後干瀉不下食蘆根飲方

生蘆根切一升 青竹茹一升 梗米三合 生薑二兩  
以水七升煮取二升隨便飲不差重作

治傷寒下利方第卅四

葛氏方治熱病不解而下利困篤欲死方

大青四兩 甘草二兩 膠二兩 豉八合

以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方以水煮豉一升文干十四枚葱白一把取三升分三服之

治傷寒飲食勞度方第卅五

病源論云大病新差血氣虛津液未復目即勞動便成

病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞於力未堪

勞而強勞則生熱氣還入經絡復為病名曰勞復

門方云論曰凡溫病新差及重病差後百日內禁食猪肉及

腸血肥菓油膩必大下利藥所本不能療也必至於死

若食餅餌染黍飴脯黏食炙肉膾蘇生棗栗諸菓

子及堅實難消之物胃氣尚冷大利難禁不下之必

死下之後兒不可不慎也

病新差後但得食粥糜寧少食令飢慎勿飽食不得

輒有所食難思之勿引日轉久可漸食麋鹿雉兔肉

等為佳

療熱病新差早起及多食葷復方



若食飽飽。米食飽。月食飽。多食飽。生食飽。食飽。死下之後。兒不可不慎也。

子及堅實難消之物。胃氣尚冷。大利難禁。不下之必死。下之後。兒不可不慎也。

療熱病新差。早起及多食。菰復方。  
艾子十枚。水二升。煎取一升。去滓。頓服之。溫卧令微汗佳。通除諸復。

又方。燒龜甲末。服方寸匕。  
葛氏方。治葛病新起。早勞及飲食多。致復欲死。死方以水服胡椒少許。又方。燒飯籬末。服方寸匕。

小品方。治食勞復方。葛根五兩。以水五升。煮取二升。冷服千金方。治食勞方。  
杏人五枚。酢二升。煮取一升。服之。取汗。又方。燒人矢灰。水服方寸匕。

治傷寒洗梳勞復方。第卅六。  
千金方云。洗手足復者。飲手足汁一合。梳頭復者。吞頭垢如粟大者二枚。千金方。治或目洗手足。或流頭勞復方。

取洗手足汁。飲一合。又方。取頭垢如粟大者。吞一枚。大者一枚。  
醫門方云。溫病差後。當靜卧。勿早起。自梳頭澡洗。但非體勞。亦不可多言語。用心使患。此皆令勞復。

又云。若欲令病不發。復者。燒頭垢如杏人大服之。治傷寒交接勞復方。第卅七。

醫門方云。溫病新差。未滿百日。氣力未平。復而已。房。



大者一枚

醫門方云溫病甚後當靜卧勿早起自梳頭澡洗但非

體勞亦不可多言語用心使患此皆令勞復

又云若欲令病不發復者燒頭垢如杏人大服之

治傷寒交接勞復方第卅七

醫門方云溫病新甚未滿百日氣力未平復而已房

室無不死者葛氏方云餘勞尚可女房多死

又癰夫契病甚而交接發或陰卵腫縮入腹中絞痛

欬死方

取女人月經赤衣燒末服方寸匕

又方取女人陰上毛燒飲之極救急

僧深方云婦人時病毒未除大夫曰幸之婦感動氣

泄毒即度著大夫名陰易病也大夫病毒未除婦人

納之其毒度著婦人者名為陽易病也

陰易病者婦人陰毛十四枚燒服之陽易病者

燒大夫陰毛十四枚服也

葛氏方云男女溫病甚後雖數十日血脈未和尚有熱毒

与之交接即得病名曰陰易欬人甚於時行宜急治之今

人身體重小腹急熱上衝胃頭重不能舉眼中生眵

眵物急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末服方寸匕日三小

便即利而陰微腫者為當愈得童女禪益良若

女病取男禪如此為之千金方醫門方同之

千金方治交接勞方

取所与交婦人衣覆男子上一食久葛氏方醫門方同之



胎物急欲死方

取婦人禪親陰上者割取燒末脹方寸匕日三小  
便即利而陰微腫者為當愈得童女禪益良若  
女病取男禪如此為之千金方醫門方同之

千金方治交接勞方

取所与交婦人衣覆男子上一食久  
又方取取女人手足心十枚女中衣帶一尺燒以酒炙米

汗飲之

治傷寒病後頭痛方第卅八

千金方云傷寒者後更頭痛壯熱煩悶方

服黃龍湯五合日三集驗方同

治傷寒病後不得眠方第卅九

病源論云大病之後府藏尚虛營衛未生故成於冷熱陰

氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩而

不得眠者心熱也若但虛煩而不得眠者瞻冷也

千金方溫膽湯療大病後虛煩不得眠此膽冷故方

生薑四兩 半夏三兩 枳實二枚 橘皮三兩

甘草一兩 竹茹二兩 六味水八升煮取二升八三服之

玉箱要錄云大病後虛煩不得眠眼闇疼懊懣方

豉七合 烏梅十四枚 水四升先煮梅取二升半

內豉煮取一升半八再服無梅用艾子十四枚

治傷寒病後汗出方第五十

病源論云大病之後復為風所乘則陽氣發泄故令

虛汗

葛氏方治大病後多虛汗及眠中汗流方



豉七合 烏梅十四枚 水四升先煮梅取二升半  
為治及好治又作喘一有所根痛也

內豉煮取一升半八再服無梅用艾子十四枚

治傷寒病後汗出方第五十

病源論云大病之後復為風所乘則陽氣發泄故令

虛汗

葛氏方治大病後多虛汗及眠中汗流方

龍骨牡蠣麻黃根梔末雜粉以粉身

錄驗方治大病之後虛汗不可心方

干薑三分 粉三八 治合以粉大良

小品方治大病後虛汗不禁方

染粉豉 凡二物入等火熬令集燒故竹扇

如掌大取灰合治以絹囊盛傳體立心最驗

當先熬豉末之與粉等也

又云治大病之後虛汗不可心方

杜仲牡蠣 凡二物入等治之向暮卧以水服

錢午上汗心者不可復服令人乾燥

治傷寒後日病方第五十一

葛氏方治毒病後毒攻目方

煮蜂巢以洗之日六七

又方冷水漬青布以掩目

又云若生瘰者燒豉二十七枚末內管中以吹

者者婆方溫病後目黃方

麥門冬葉三握以水一升煮取三升去滓少飲

之自差

謹要方療傷寒病溫毒丸病持于安氣者病之後毒



黃蜂巢以洗之日六七

二升云僧深方治醫

又方冷水漬青布以掩目

集驗方治醫

又云若生瘡者燒敗二七枚末內管中以吹

集驗方同之

者者婆方溫病後目黃方

麥門冬葉三握以水一升煮取三升去滓少飲

之自差

極要方療傷寒病溫毒熱病時行疫氣諸病之後毒

充眼中生赤脉赤膜白膚白瞖者方悉主之有患赤

痛不得見光病毒煩惱應心者洗之即心神効之方

秦皮二兩 升麻二兩 黃連二兩

右以水洗去塵屑然後以水四升煮取二升半

三合眼作以綿繞箸沾取湯以滴眼中如屋漏狀

盡三合心須更復用如前法日五六過佳

治傷寒後黃疸方第五十二

葛氏方治時行病發黃方

茵陳蒿六兩 大黃二兩 艾子十二枚以水一斗先煮艾

茵陳取升去滓內二藥又煮取三升分四服之

千金方治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃三兩以清酒五升煮得一升半盡脹之覆取汗

治傷寒後虛腫方第五十三

千金方治病後虛腫方

豉五升淳酒一升煮三沸及熱頓服不耐酒隨性覆汗

治傷寒手足腫痛欲脫方第五十四

千金方毒熱病攻手足腫痛欲脫方

馬矢煮漬之 又方以桐穰灰汁漬之



治傷寒後虛腫方第五十三

千金方治病後虛腫方

豉五升升淳酒一升升煮三沸及熱頓服不耐酒隨性覆セリ

治傷寒手是腫痛欲脫方第五十四

千金方毒熱病攻手足腫痛欲脫方

馬矢煮漬之又方以桐糠灰汁漬之

又方常思草絞取汁以漬之又方以桐糠灰汁漬之

又方削黃蘗水煮漬之

又方煮猪蹄取汁以白葱鹽炒着中以漬手足冷則易

集驗方治毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

濃煮帛杖根以漬手足又方酒煮苦參漬之

治傷寒後下利方第五十五

小品方治溫熱為毒及太陽傷寒外熱內虛熱攻腸胃

下黃赤汁及如爛肉汁及赤滯赤滯熱腸痛者諸熱毒

下良方

艾子十四枚艾子豉一升豉薤白一席口

凡三物切以水四升煮艾子薤白令熟內豉取

二升半八三服

經心方治熱病後赤白利痢痛不可忍方

香豉一升香豉黃連三兩黃連薤白三兩

以粳米泔汁五升煮取二升半八三服之

醫門方療傷寒後下利瀉水不能食方

黃連三兩黃連烏梅肉二兩烏梅蠲一兩洋蠲和蜜合

為丸空腹如梧子服廿九日再加至四五丸

又方取龍骨末服方寸匕佳



香豉一升 黃連三兩 薤白三兩

以粳米泔汁五升煮取二升半分三服之

醫門方療傷寒後下利膿水不能食方

黃連三兩 烏梅肉二兩 蟬一兩 洋槐和蜜合

為丸空腹如梧子服廿九日再加至四五丸

又方取龍骨末服方寸匕佳

治傷寒後下部癢痛方第五十六

葛氏方治大孔中卒癢痛如鳥啄方

赤小豆一升大豆一升合搗兩葉盛置之令

熱牙坐上

又云治毒病下部生瘡方

熬鹽以深導之不過三

又方煮桃皮煎如粉以綿合導之

范汪方治大孔中癢方

取女萎治下節綿裹著大適中癢絕乃

出藥

治傷寒豌豆瘡方第五十七

病源論云夫表虛裏實熱毒內盛則多發瘡重者周匝

遍身其狀如大瘡若色赤頭白者則毒輕若色紫黑

則毒重其瘡形如豌豆之各豌豆瘡

今案千金方云小便澀有血者中壞瘡黑廔不

出膿死

千金方治豌豆瘡方

初發覺欲作則煮大黃五兩服之愈

又方取好蜜通身瘡磨上又方以蜜並麻葉之



海... 則毒重其瘡形如<sup>ツラメ</sup>豌豆之<sup>ツツ</sup>名豌豆瘡

今案千金方云小便澀有血者中壞瘡黑廔不出膿死

千金方治豌豆瘡方

初發覺<sup>オホ</sup>欲作則煮大黃五兩服之愈

又方取好蜜通身瘡磨上又方以蜜<sup>トリツア</sup>並<sup>シ</sup>麻<sup>シ</sup>之

又方青木香二兩水三升煮取一升頓服<sup>方同上</sup>老<sup>要</sup>

又方小豆屑<sup>カタ</sup>鷄子白和傳之<sup>ツケ</sup>又方婦人月布拭之<sup>モ</sup>

又方青木香湯方青木香二兩丁香一兩

董陸香一兩白礬石一兩射香二兩石五味以水四

升煮取<sup>升</sup>一半八再服<sup>オラ</sup>熱毒盛者加一兩犀角無犀

角外麻代病輕去礬石大神驗<sup>アリ</sup>

葛氏方治時行蛇瘡方

以水濃煮外麻綿沾洗拭之<sup>シ</sup>入苦酒漬煮<sup>ル</sup>弥好

救急車驗方瘡時患遍身疤初覺出方

即服三黃湯令利<sup>ル</sup>疤即滅<sup>ナ</sup>又方飲<sup>ナ</sup>鐵漿<sup>ナ</sup>一升五著

又方小豆末一合和水服驗

新錄方豌豆瘡滅廔方

鷹矢<sup>クツツ</sup>粉上若瘡干和猪脂<sup>アイ</sup>脂<sup>フ</sup>日三又方胡粉付上

又方桑白汁和鷄子白塗之<sup>ナ</sup>又方用蜜塗之<sup>ナ</sup>

千金方云芒消和猪膽<sup>都散</sup>塗瘡上勿動<sup>カ</sup>痂落無痕<sup>キハ</sup>

今案天平九年六月廿六日下諸國官有女兒是疫病名赤

斑瘡初發之時既似瘧疾瘡出之間經三四日支體府

藏大契如燒當是之時欲飲冷水固忌莫飲以綿能

勒腹腰必令溫和勿使冷寒又鋪設既薄无卧地上唯



鷹矢抄上若瘡干和猪脂塗日三

又方胡粉付上

又方桑白汁和雞子白塗之

千金方云芒消和猪膽塗瘡上勿動痂落無痕

今案天平九年六月廿六日下諸國官存女几是疫病名赤

斑瘡初發之時既似瘰癧疾瘡出之間經三四日支體府

藏大契如燒當是之時欲飲冷水固忌莫飲以綿能

勒腹腰必令溫和勿使冷寒又鋪設既薄无卧地上唯

於床上數箬席得卧息又粥饘并煎餅粟芽汁溫冷

任意可用又糯粳糲以湯饘食之又病愈之後雜經廿

日不得輒喫鮮菓菜并飲水及洗浴房室強行步

當風雨年更不可食但乾麩堅菓等煎否皆良

傷寒後食禁第五十八

養生要集云凡溫病傷寒愈後但宜食糜粥唯少

勿食大飽引日轉久可轉合羊脂雉兔麋羹汁少

食之慎不慎病復致死

又云凡傷寒毒病愈百日之內禁食猪羊腸血肥菓臍

乾之難消之物不禁者則令泄利不可復救也

養性志云諸病愈後勿食五辛食之令人目失明

七卷食經云時行病愈食禁葫蘆蝦蟹蚶蟹不禁病復

發則難治後年輒發

時行病後禁餅餌菓臍諸生菓菜難消之物皆復發病

時行汗解愈後勿飲冷水損心肥常虛不能伏

時行病人不可食鯉鮓小鯉及鮓令病不愈

又勿食生棗及羊糞隔上乃為契燔

凡病人不得食熊肉令作長病終不除愈

時行後禁飲酒食菓令泄利難治



時行病後禁餅餌與膾諸生菓菜難消之物皆復發病

時行汗解愈後勿飲冷水損心肥常虛不能伏

時行病人不可食鯉鮓小鯉及鮓令病不愈

又勿食生菜及羊糞隔上乃為契燔音藥釋氏云火光也

凡病人不得食熊肉令作長病終不除愈

時行後禁飲酒食與糞令泄利難治

時病愈後未滿三月食鮓與復食諸菜三年肌膚

德陸及子麻云或作鮓

又食梅油脂物令暴利難治 又食菰令病復

發 又食蒜鱸令人損脂消 又未滿三月食鮓鮓即復

病 時行病後未食青花菜令人手足損重

又飲酒合陰陽復病必死 又食生菜合陰陽復必死

治傷寒變成百合病方第五十九

千金方云百合病者是一百脉一宗悉致病也其狀惡寒而

欬者病在上焦也 其腹滿微喘大便堅三四日一便

時復小便者病在中焦也 其狀小便淋瀝難者病在

下焦也 各隨其證以治之耳

百合之病令人飲食復不能食或有羨時或有不用聞

飲及舐鼻如有寒其實無如有熱其後無他常默欲

卧復不能眠至朝口苦小便赤欲行復不能行也諸藥

不治治之即劇如有神靈所為也

百合病其脉微數其候溺時即頭覺痛者六十日乃愈

百合病候之溺時即不覺痛者如寒者卅日愈

百合病證或其人未病已豫見其候者或已病一月廿日

復見其候者治之喜誤也依證治之治百合病已經發



卧復不能眠至朝口苦小便赤欲行復不能行也諸藥不治治之即劇如有神靈所為也

百合病其脉微數其候溺時即頭覺痛者六十日乃愈

百合病候之溺時即不覺痛者如寒者卅日愈

百合病證或其人未病已豫見其候者或已病一月廿日

復見其候者治之喜誤也依證治之治百合病已經發

之後者方

百合根取七枚ツアセ之洗水二升漬之一宿當沫出水

中明且去水取百合以泉水二升煮百合取一升汁

復取ヤトニ知母三兩切以泉二升煮取一升汁合和百

治百合病已經下之後者方

滑石三兩ツカシ代諸一兩以水三升煮取一升內百合汁如前

法一升合和復煎取一升半分再服之

治百合病始不經發汁不吐不下其病如初者方

生地黄汁三升和百合汁後煎取一升半分再服大

便當去汗為候也治百合病已經吐之後者方百合汁一升如前

治百合病經一月不解變如渴者方

取百合根一升水一斛漬之一宿以汁洗病人身也洗

身竟食白餅勿与塩豉也渴不羸可用栝樓根并

杜厲分等為散飲服方寸匕日三

治百合病變發熱者方

滑石三兩 百合根一兩

右カカシ燔之飲服方寸匕日三當微利者心勿復服也

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少イリ煎令黃色飲服方寸匕日



杜<sup>馬</sup>属分等為散飲<sup>シ</sup>脹方寸匕日三

治百合病變發<sup>化</sup>熱者方

滑石三兩 百合根一兩

右<sup>カ</sup>燉<sup>カ</sup>之飲<sup>シ</sup>脹方寸匕日三當微利<sup>リ</sup>者心勿復<sup>シ</sup>脹也

治百合病變腹中滿<sup>フ</sup>痛者方

但取百合根隨多少<sup>イ</sup>契<sup>イ</sup>契令黃色<sup>ナ</sup>飲<sup>シ</sup>脹方寸匕日

三滿消<sup>シ</sup>痛<sup>ル</sup>心

治時行後<sup>テ</sup>變成<sup>ル</sup>瘧方第六

錄驗方云大五補湯治時行後<sup>テ</sup>變成<sup>ル</sup>瘧方

芍<sup>ク</sup>杞<sup>ク</sup>白皮一斤 麥<sup>ヤ</sup>門<sup>ル</sup>冬<sup>ル</sup>一升 生<sup>ク</sup>薑<sup>ル</sup>一斤干地黃三兩

當<sup>オ</sup>歸<sup>ホ</sup>三兩 黃<sup>カ</sup>耆<sup>ハ</sup>三兩 人<sup>カ</sup>參<sup>ク</sup>三兩 甘<sup>ア</sup>草<sup>ル</sup>三兩

伏<sup>ト</sup>苓<sup>ホ</sup>三兩 生<sup>キ</sup>竹<sup>シ</sup>葉<sup>ル</sup>五兩 遠志皮三兩 木<sup>シ</sup>三兩

芍<sup>シ</sup>藟<sup>チ</sup>二兩 桂<sup>シ</sup>心<sup>ル</sup>五兩 大<sup>素</sup>麥<sup>ル</sup>廿枚 桔<sup>ア</sup>梗<sup>ル</sup>二兩

夕<sup>モ</sup>藥<sup>ホ</sup>三兩 半<sup>ホ</sup>夏<sup>ル</sup>二兩 洗

凡十八物切以水一斗五升煮取三升分四<sup>リ</sup>脹一日令盡之

醫心方卷第十四